


**Instrucciones:**

- a) **Duración:** 1 hora y 30 minutos.
- b) Tienes que **elegir** entre realizar únicamente los cuatro ejercicios de la **Opción A** o realizar únicamente los cuatro ejercicios de la **Opción B**.
- c) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma.
- d) Contesta de forma razonada y escribe ordenadamente y con letra clara.
- e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. No obstante, todos los procesos conducentes a la obtención de resultados deben estar suficientemente justificados.

**Opción A**

**Ejercicio 1.- [2'5 puntos]** Una ventana *normanda* consiste en un rectángulo coronado con un semicírculo.

De entre todas las ventanas *normandas* de perímetro 10 m, halla las dimensiones del marco de la de área máxima.



**Ejercicio 2.- [2'5 puntos]** Calcula el valor de  $b > 0$ , sabiendo que el área de la región comprendida entre la curva  $y = \sqrt{x}$  y la recta  $y = bx$  es de  $\frac{4}{3}$  unidades cuadradas.

**Ejercicio 3.-** Considera las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & -1 & \lambda \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (a) [1 punto] ¿Hay algún valor de  $\lambda$  para el que  $A$  no tiene inversa?
- (b) [1'5 puntos] Para  $\lambda = 1$ , resuelve la ecuación matricial  $A^{-1}XA = B$ .

**Ejercicio 4.-** Dados los puntos  $A(1, 0, 0)$ ,  $B(0, 0, 1)$  y  $P(1, -1, 1)$ , y la recta  $r$  definida por  $\begin{cases} x - y - 2 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

- (a) [2 puntos] Halla los puntos de la recta  $r$  cuya distancia al punto  $P$  es de 3 unidades.
- (b) [0'5 puntos] Calcula el área del triángulo  $ABP$ .

**Instrucciones:**

- a) **Duración:** 1 hora y 30 minutos.
- b) Tienes que **elegir** entre realizar únicamente los cuatro ejercicios de la **Opción A** o realizar únicamente los cuatro ejercicios de la **Opción B**.
- c) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma.
- d) Contesta de forma razonada y escribe ordenadamente y con letra clara.
- e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. No obstante, todos los procesos conducentes a la obtención de resultados deben estar suficientemente justificados.

**Opción B**

**Ejercicio 1.-** Sea  $f: [\frac{1}{e}, 4] \rightarrow \mathbb{R}$  la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} x - \ln(x) + a & \text{si } \frac{1}{e} \leq x \leq 2 \\ bx + 1 - \ln(2) & \text{si } 2 < x \leq 4 \end{cases}$$

donde  $\ln$  denota la función logaritmo neperiano.

- (a) [1'25 puntos] Calcula los valores de  $a$  y  $b$  para que  $f$  sea derivable en el intervalo  $(\frac{1}{e}, 4)$ .
- (b) [1'25 puntos] Para  $a = 0$  y  $b = \frac{1}{2}$  halla los extremos absolutos de  $f$  (abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan).

**Ejercicio 2.- [2'5 puntos]** Sea  $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$  la función definida por  $f(x) = x(1 - \ln(x))$ , donde  $\ln$  denota la función logaritmo neperiano. Determina la primitiva de  $f$  cuya gráfica pasa por el punto  $P(1, 1)$ .

**Ejercicio 3.-** Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & t+1 & t-1 \\ -2t-1 & 0 & t+3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

- (a) [1'75 puntos] Calcula el rango de  $A$  según los diferentes valores de  $t$ .
- (b) [0'75 puntos] Razona para qué valores de  $t$  el sistema homogéneo  $AX = \mathbf{0}$  tiene más de una solución.

**Ejercicio 4.-** Dados el punto  $P(1, 1, -1)$  y la recta  $r$  de ecuaciones  $\begin{cases} x + z = 1 \\ y + z = 0 \end{cases}$

- (a) [1 punto] Halla la ecuación del plano que contiene a  $r$  y pasa por  $P$ .
- (b) [1'5 puntos] Halla la ecuación de la recta contenida en el plano de ecuación  $y + z = 0$ , que es perpendicular a  $r$  y pasa por  $P$ .